



مراقبت های پس از عمل ختنه

- پس از ختنه به روش حلقه گذاری، طبق معمول کودک را حمام کنید و (اگر توصیه خاصی توسط پزشک معالج داده نشده) بگذارید محل ختنه در معرض هوا باشد.
- تا یک هفته هر روز کودک را حمام کنید.
- اگر از روش جراحی استفاده شده، کودک با پانسمان مرخص خواهد شد. اجازه دهید پانسمان خودش جدا شده و بیفتد (مگر آن که پزشک معالج دستور خاصی داده باشد) اگر پس از ۵-۴ روز پانسمان جدا نشد در حمام پس از خیس شدن به آرامی آن را از روی آلت کودک جدا کنید. پس از آن هم نیاز به پانسمان ندارد.
- در روش حلقه گذاری، معمولاً حلقه بین ۱۰ - ۵ روز خواهد افتاد. ازدست کاری کردن یا کشیدن حلقه اجتناب نمایید و اجازه دهید حلقه خودبخود بیفتد.
- برای پیشگیری از تنگی مجرا، تا یک ماه ادرار کودک با آب شسته شود. و به مدت ۴ - ۳ ماه، پس از هر بار تعویض پوشک و نیز پس از استحمام، محل نوک آلت کودک را با پماد ویتامین A یا وازلین طبی چرب نمایید (از پماد زخم هم می توان استفاده کرد).
- نیازی نیست پوشک کودک را زود به زود تعویض کنید. به قرار معمول رفتار نمایید. فقط پوشک شل بسته شود.
- اگر دارو تجویز شده، طبق دستور مصرف شود.
- ممکن است اولین نوبت ادرار پس از ختنه چند ساعتی طول بکشد. اگر احساس کردید بی قراری کودک به علت ادرار نکردن است، حمام گرم ممکن است کمک کننده باشد. در صورت ادرار نکردن کودک، به پزشک یا اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

علائم هشدار: (برای مراجعه فوری به پزشک یا اورژانس بیمارستان)

- تب
- خونریزی از محل ختنه
- وجود ترشحات بدبو در نوک آلت
- اگر کودک دو وعده ی متوالی شیر نخورد.
- جدا نشدن حلقه، حداکثر ۱۰ روز بعد از ختنه
- اگر کودک ۶ ساعت پس از ختنه ادرار نکرده باشد.
- اگر به نظر برسد حلقه جابجا شده یا تنه آلت تحت فشار است (تورم آلت)
- بی قراری زیاد کودک با گذشت ۲۴ ساعت از ختنه
- افتادن حلقه زودتر از موعد مقرر