

سیمیکورت

راهنمای بیمار

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

مکانیسم اثر:

سیمیکورت یک داروی استنشاقی ترکیبی است که از دو نوع داروی متفاوت تشکیل شده است؛ بودزوناید دارویی از دسته ی کورتون هاست (کورتیکواستروئید) که خاصیت ضد التهابی دارد. فورمتروپول دارویی طولانی اثر از دسته ی گشاد کننده های راه هوایی در ریه ها است که با تاثیرات شل کنندگی روی عضلات راه هوایی باعث تنفس راحت تر بیمار می گردد. اثر این دارو طی ۱ تا ۳ دقیقه شروع و تا ۱۲ ساعت ادامه می یابد.

موارد مصرف:

- پیشگیری و درمان انقباضات برونش در بیماران با انسداد راه های هوایی برگشت پذیر مانند آسم
- انقباضات ریه ناشی از مواد حساسیت زا
- پیشگیری و درمان انقباضات برونش در بیماران با انسداد مزمن راه های هوایی مانند برونشیت و آمفیزم (COPD).

میزان مصرف:

میزان مصرف در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان متفاوت بوده و بهتر است با نظر پزشک معالج باشد.

قبل از شروع درمان با سیمیکورت به موارد زیر توجه نمایید:

۱. در صورت حساسیت به داروی بودزوناید و فورمتروپول یا لاکتوز (قند شیر) نباید از داروی سیمیکورت استفاده شود.
۲. سیمیکورت یک گشادکننده ریه زود اثر نیست. بنابراین در زمان حمله آسم نباید از آن استفاده کرد.

۳. در صورت ابتلا به هر یک از بیماری ها یا شرایط زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

- دیابت، عفونت ریه، فشار خون بالا یا هر گونه مشکل قلبی (مثل نارسایی، تنگی عروق، ضربان شدید و
- وجود مشکل تیروئیدی یا غدد فوق کلیوی، وجود پتاسیم خون پایین، مشکلات کبدی

۴. در صورت استفاده از سایر داروها بویژه داروهای زیر پزشک خود را مطلع کنید:

- | | |
|---|--|
| - داروهای فشار خون مانند آنتولول یا پروپرانولول | - داروهای ادرار آور مانند فوروزماید یا لازیکس |
| - داروهایی که برای کنترل مشکلات ریتم قلب استفاده می شود مانند کینیدین | - داروهایی که برای نارسایی قلبی مصرف می شود مانند دیگوکسین. |
| - داروهای چشمی مانند تیمولول که در گلوکوم (آب سیاه) استفاده می شود | - داروی کورتون مانند پردنیزولون |
| - تتوفیلین و آمینوفیلین | - سالبوتامول یا داروهای مشابه |
| - داروهای اعصاب مانند آمی تریپتیلین و داروهای ضد افسردگی | - فنوتیازین ها مانند کلروپرومازین |
| - داروی ضد پارکینسون مانند لوودوپا | - داروهای تیروئید مانند لوتیروکسین |
| - داروهایی که برای درمان ایدز تجویز می شوند | - آنتی بیوتیک هایی مانند: کتوکونازول، کلاسید یا کلاریترومایسین |

سیمبیکورت

راهنمای بیمار

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

۵. اگر قرار است تحت بیهوشی عمومی، مثلا برای جراحی خاصی قرار بگیرید یا کار دندانپزشکی دارید به پزشک خود اطلاع دهید.
۶. برای استفاده در طی حاملگی یا شیردهی حتما باید با پزشک معالج مشورت نمایید.
۷. استفاده از سیمبیکورت مانعی برای رانندگی یا انجام برخی امور که به هوشیاری نیاز دارند نمی باشد.
۸. داروی سیمبیکورت را دقیقا طبق دستور پزشک معالج مصرف نمایید.
۹. اگر آسم دارید و با وجود مصرف سیمبیکورت دچار تنگی نفس یا تنفس صدادار(شنیدن صدای ویز)هستید مصرف آن را قطع نکنید ولی هر چه زودتر به پزشک معالج مراجعه نمایید.

۱۰. در موارد زیر سریعا به پزشک معالج مراجعه نمایید:

- اگر نفس کشیدن شما سخت تر شده یا اغلب اوقات با تنگی نفس از خواب بیدار می شوید.
- اگر هنگام صبح احساس سنگینی در قفسه سینه دارید
- اگر سنگینی قفسه سینه بیشتر از قبل ادامه می یابد

در صورت بروز هر کدام از موارد زیر، استفاده از سیمبیکورت را قطع و فورا به پزشک معالج اطلاع دهید;

- تورم صورت، بویژه اطراف دهان، زبان، گلو(سخت شدن بلع) و هم زمان احساس سخت شدن نفس کشیدن و یا احساس غش و ضعف که ممکن است نشان دهنده واکنش حساسیتی شدید از نوع آنژیوادم باشد که البته نادر بوده و ۱ در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ممکن است اتفاق بیفتد.
- شروع ناگهانی نفس های صدادار(ویز یا سوت) یا احساس کوتاهی و تنگ شدن نفس بلافاصله پس از شروع به استفاده از سیمبیکورت که در این صورت باید استفاده از سیمبیکورت را کنار گذاشته و از اسپری قبلی خود استفاده نموده و فورا با پزشک خود تماس بگیرید. این مورد هم نادر بوده و ۱ در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت ممکن است اتفاق بیفتد.

عوارض شایع:

- تپش قلب یا احساس لرزش بدن که با ادامه مصرف دارو به مرور برطرف می شود.
- عفونت قارچی دهان
- گلودرد، سرفه، خشونت (کلفت شدن) صدا

عوارض کمتر شایع:

- احساس بی قراری یا عصبی بودن
- اختلال خواب
- تندتر شدن یا نامنظم شدن ضربان قلب
- سرخی پوست
- گرفتگی عضلانی
- پایین آمدن میزان پتاسیم خون
- تغییر مزه دهان

PE-PA 075: