

K.U.B I.V.P

عکس تخصصی (رنگی) با ماده حاجب از دستگاه ادراری
و نحوه آماده شدن برای این آزمون ها

قاعدگی جهت عکس برداری به بخش رادیولوژی
مراجعه کنند.

— وجود **همراهان** در اتاق رادیوگرافی ضرورتی
ندارد، مگر بیمار خردسال یا ناتوان یا اورژانسی
حاد باشد و نیاز به همراه داشته باشد که در این
صورت با پوشیدن روپوش سربی میتواند کنار
بیمار خود بماند.

نکات مهم قابل توجه بیماران:

- ۱- در **کودکان** خوردن چند قاشق غذاخوری روغن
کرچک کفایت میکند و نیاز به مصرف ۴۰ گرم
نیست.
- ۲- نوزادان و خردسالان ، ۲ تا ۳ ساعت قبل از
آزمون مایعات مصرف نکنند.
- ۳- **بیماران دیابتی** و نوزادان منع مصرف مایعات
ندارند.

توجه مهم:

- ۱- در تمامی آزمونهای رادیولوژی، عکس برداری
از **خانم های باردار** ممنوع میباشد، مگر در
موارد اورژانسی و با دستور کتبی پزشک
معالج.
- ۲- در صورتی که بیمار زن باشد، باید از **عدم
بارداری** او مطمئن شد. رعایت قانون ۱۰ روز
الزامی است.

قانون ۱۰ روز یا 10 days Roll :

رعایت این قانون برای کلیه زنانی که مستعد
بارداری هستند الزامی است. یعنی خانم های جوان
مجازند تا ۱۰ روز پس از اولین روز، آخرین

K.U.B

پرتونگاری ساده از دستگاه ادراری به عنوان آزمون مقدماتی جهت مطالعه کلیه ها ، حالب ها و مثانه در رابطه با سنگهای ادراری (حاجب) ، سل یا تومورها در کلیه ها، پروستات و مثانه و نشان دادن سایه نسج نرم کلیه ها انجام می شود. در صورت اورژانس نبودن و فوریت نداشتن ، این آزمون حتماً با آمادگی روده ای انجام می شود.

I.V.P

پرتونگاری (عکسبرداری) تخصصی یا رنگی از دستگاه ادراری با داروی حاجب شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه می باشد. این عکس اساسی ترین روش بررسی سیستم ادراری بوده و سیستم فیزیولوژیک دستگاه ادراری را بررسی می کند.

این آزمون با تزریق ماده حاجب به داخل جریان خون (از طریق ورید دست و توسط آنژیوکت) انجام می گیرد.

ماده حاجب از طریق خون به کلیه ها می رسد و باعث افزایش غلظت ادرار می شود.

مدت زمان آزمون I.V.P:

مدت زمان این آزمون از نیم ساعت و برحسب نیاز کلیشه های تأخیری تا ۶ الی ۲۴ ساعت هم به طول می انجامد.

نکات قابل توجه بیماران :

- بیمار نیاز به تعیین وقت قبلی دارد. **دانستن وزن دقیق** بیمار جهت تعیین میزان داروی حاجب ضروری است.
- بیمار باید آمادگی روده ای کامل داشته و صبح، **ناشتای کامل** مراجعه کند.
- ادرار کردن چند لحظه قبل از آزمون I.V.P ضروری است.
- اطمینان از **عدم بارداری** خانم ها در تمام آزمون های رادیولوژی ضروری است.
- در صورتیکه بیمار **سابقه حساسیت دارویی** یا غذایی دارد یا **بیماری خاصی مثل آسم ، دیابت، هپاتیت، ایدز** یا غیره دارد ، قبلاً به اطلاع مسئول پذیرش رادیولوژی برساند.
- پس از اتمام عکس رنگی و مراجعه بیمار به منزل با مصرف مایعات بیشتر ، دارو از طریق ادرار دفع خواهد شد.

دستور آمادگی روده ای:

- روده باید از مواد دفعی (گاز و مدفوع) تخلیه شده باشد. برای این منظور بیمار ۲۴ ساعت قبل از انجام رادیوگرافی باید رژیم غذایی سبکی داشته باشد.
- مواد گازدار مثل نوشابه، دوغ و شیر مصرف نکنند. غذاهای سبک ، کم حجم و کم فیبر و فاقد حبوبات مصرف کند.
- استفاده از مسهل روغنی مثل روغن کرچک یا لاکساریسین بمیزان ۴۰ gr الزامی است.
- بیمار باید مسهل را حدود ساعت ۶ یا ۷ بعدازظهر قبل از روز آزمون مصرف کند و پس از آن از مصرف مواد غذایی خودداری کند. (شام نخورد)
- بیمار می تواند روغن کرچک را همراه با شربت آبلیمو یا چای مصرف کند.
- بیمار باید ۸ ساعت قبل از آزمون ناشتا باشد و از مصرف مایعات بخصوص آب خودداری کند.
- در مورد کسانی که نمیتوانند مسهل روغنی مصرف کنند، با صلاحدید بخش رادیولوژی از قرص بیزاکودیل یا C.Lax طبق دستور بخش رادیولوژی استفاده کنند. ۲ قرص ایمتیکون ظهر قبل از آزمون مصرف شود.